

L'identifier



Frelon asiatique
(taille réelle 3 cm)



Frelon commun
(jusqu'à 4 cm)

Dés les premiers beaux jours, les femelles fécondées qui étaient cachées sortent et se nourrissent abondamment avant de construire leur premier nid (nid primaire) et de pondre leurs premiers œufs.

Plus tard dans la saison la reine et ses ouvrières construiront un autre nid (nid secondaire) que l'on peut voir à la cime d'un arbre dans une haie, dans une grange etc.

Ce nid consommera en moyenne 11 KG d'insectes, dont 30% d'abeilles.



Nid Primaire



Nid secondaire

Au printemps

Vous pouvez aider à combattre le frelon

En piégeant les reines de février à fin mai afin qu'elles ne confectionnent pas ces nids si dangereux pour notre biodiversité.



Neoppi



Le parfait



Réducteur diam 9 mm



5 Trous de 6 mm
Piège à cloche



Piège tap trap
Bouteille trou 6 mm



Vetopharma

Vous trouverez ces pièges en jardinerie ou renseignez vous auprès des apiculteurs

En été et en automne

La détection des nids est très importante. Vous découvrez un nid dans un arbre, dans une haie, un bâtiment...

En aucun cas vous essayez d'agir seul. Il est bien trop dangereux de vouloir le détruire soit même.

Signalez le à la mairie

La destruction des nids est difficile et dangereux, adressez vous à un professionnel.

Recettes maison

1 canette de Bière
+ ¼ Sirop
+ vin (facultatif)

ou

Activeur pièges à frelons
5 cl + 25 cl d'eau



Mail : apidor.frelons@gmail.com



Le frelon asiatique un véritable destructeur

Nous sommes tous en danger
Biodiversité menacée
Risque pour l'humain



IL EST URGENT
Mobilisons nous

